

CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - MAKÓ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ
	STERNUMPUNCTIO

Kedves Betegünk!

**Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!**

*Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is alátámasztottak - „Sternumpunctió”-t szükséges elvégezni!*

**1. A beavatkozás célja:**

Megtudni, hogy a szegycsontban a csontvelő (vérképzés) ép-e.

**2. A beavatkozás elmaradásának következménye:**

Vizsgálati módszer, amely vérképzőszervi betegség felismerésére szolgál.

A beavatkozás elmaradása esetén nem válik ismertté a csontvelő működésének állapota, amely a célirányos gyógykezelés alapja. Elmaradása életveszélyes következménnyel járhat!

**3. A beavatkozás eredménye:**

Az így nyert csontvelőből megfelelő kenetet készítünk, amely festés után vizsgálható.

**4. A beavatkozás ismertetése:**

Mindig fekvő helyzetben (vízszintes, párna nélküli) végezzük el a beavatkozást.

4.1. Gyógyszerérzékenységéről még a vizsgálat előtt tájékoztassa kezelőorvosát.

4.2. Érzéstelenítés:

A szegycsontot fedő bőrt, valamint a szegycsont külső felszínét Lidocainnal érzéstelenítjük fecskendő és injekciós tű segítségével.

4.3. Kivitelezés:

A punctióhoz, szurcsapoláshoz olyan speciális tűt használunk, amelyen szabályozható toldalék hengerlapja adja meg a behatolás maximális mélységét. Ilyen módon elkerülhető a sternum (szegycsont) hátsó falának átfúródása. A beszúrás a második bordaközi rés magasságában a szegycsont közepén történik, mintegy 60 fokos szögben a bőrön, majd a szegycsontra merőleges helyzetben.

Ha a velőűrben vagyunk, a tű középső kivehető részét (mandrin) kivesszük, fecskendőt helyezünk a tűre, és a dugattyú meghúzásával kevés csontvelőt szívunk a fecskendőbe.

A csontvelő megszívásakor éles fájdalom jelentkezik a szegycsontban.

4.4. A vizsgálat befejezése:

A tű kihúzása után nyomókötéssel látjuk el a szúrt sebet.

2 óra hosszáig fekvé kell maradnia az osztályon.

Fizikális vizsgálatot követően panaszmentesség esetén távozzon az intézetből.

**5. A beavatkozás lehetséges szövődménye:**

- A szegycsont átfúródása (perforációja),
- Vérzés a szúrás helyén,
- Fájdalom.

Az esetleges szövődmények kezelésére intézetünk orvosai felkészültek.

A szövődmények elkerülésére minden lehetséges eszközzel törekedni fogunk. Megoldásukhoz szükség esetén más szakterület képviselőinek segítségét kérhetjük.

A felsorolt szövődmények ritkák, de a leg Gondosabb műtéti technika mellett, tapasztalt és gyakorlott orvos beavatkozása során is előfordulhatnak.

A téma teljes körű kifejtése tájékoztatónk kereteit meghaladja!

Dr. Pálincás Attila

osztályvezető főorvos